

ជំងឺរលាកខួរក្បាលជប៉ុន

អ្វីទៅជាជំងឺរលាកខួរក្បាលជប៉ុន?

ជំងឺរលាកខួរក្បាលជប៉ុន បង្កឡើងដោយវីរុសរលាកខួរក្បាលជប៉ុន។ ជំងឺនេះគឺធ្វើឱ្យរលាកជាលិកាខួរក្បាល ហើយជាទូទៅបង្កឡើងដោយការឆ្លងរោគ។

ជំងឺរលាកខួរក្បាលជប៉ុនឆ្លងតាមរយៈមូសខាំ ហើយវាក៏មានឡើងជាទូទៅនៅក្នុងតំបន់ដែលសកម្មភាពមូសមានការកើនឡើង។

ការឆ្លងទៅមនុស្សជាទូទៅមិនបង្ហាញរោគសញ្ញាឡើយ ប៉ុន្តែនៅក្នុងស្ថានភាពជំងឺជប៉ុន ជំងឺនេះអាចឈានទៅរកសភាពធ្ងន់ធ្ងរ ឬក៏អាចនាំឱ្យបាត់បង់ជីវិត។

តើវីរុសនេះឆ្លងរាលដាលដោយរបៀបណា?

វីរុសនេះឆ្លងតាមរយៈការខាំរបស់សត្វមូសដែលមានជំងឺ។ វីរុសនេះមិនអាចឆ្លងពីមនុស្សទៅមនុស្សបានឡើយ ឬក៏ដោយការទទួលទានសាច់សត្វដែលមានជំងឺនេះ។

សត្វជ្រូកនិងបក្សីព្រៃរស់នៅលើទឹក មានក្នុងនាទីសំខាន់ក្នុងការចម្លងវីរុសនៃជំងឺនេះ។ វីរុសនេះធ្វើការបែងភាគនៅក្នុងខ្លួនសត្វជ្រូកដែលមានជំងឺ ញ៉ាំងឱ្យកម្រិតនៃការឆ្លងនៅក្នុងឈាមជ្រូកមានកម្រិតខ្ពស់។ សត្វមូសដែលខាំបីតយកឈាមជ្រូកដែលមានជំងឺទំនងជាប្រាកដណាស់ថាបានឆ្លងវីរុសនេះ ហើយបន្ទាប់មកក៏ចម្លងបន្តទៅមនុស្សលោក។

រោគសញ្ញានានា

រោគសញ្ញានានានៃជំងឺរលាកខួរក្បាលជប៉ុន រួមមាន៖

- ឈឺក្បាល
- គ្រុនឡើងកម្ដៅ
- ប្រកាច់ ឬប្រគ្រឺវ (ជាពិសេសនៅក្នុងចំណោមកុមារក្មេងៗ)
- រីងកញ្ជឹងក
- អារម្មណ៍ងោកងុយ
- រង្វង់កាន់កាំង ហើយឈានទៅភាពរើវាយ និង
- សន្លប់បាត់ស្មារតី នៅក្នុងករណីធ្ងន់ធ្ងរ។

ជាទូទៅការធ្លាក់ខ្លួនឈឺក្រោយពីមូសខាំ មានរយៈពេលរវាងពី 5 ទៅ 15 ថ្ងៃ។

បើសិនជាអ្នកគិតថា អ្នកអាចឆ្លងវីរុសនៃជំងឺរលាកខួរក្បាលជប៉ុន ចូរស្វែងរកជំនួយពេទ្យជាបន្ទាន់។

ការព្យាបាល

គ្មានវិធីព្យាបាលជំងឺរលាកខួរក្បាលជប៉ុនឡើយ។ អ្នកអាចសម្រាលនូវអាការរោគទាំងនោះបាន ដោយ៖

- សម្រាកឱ្យបានច្រើន
- ទទួលទានជាតិទឹកឱ្យបានច្រើន
- លេបថ្នាំបំបាត់ការឈឺចាប់ និងគ្រុនក្ដៅ

នៅក្នុងករណីធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំង ការចូលសម្រាកក្នុងមន្ទីរពេទ្យដើម្បីការពារមើលជំងឺអាចជាការចាំបាច់។

វិធីការពារខ្លួនអ្នក

មានវិធីពីរយ៉ាង ដើម្បីបង្ការជំងឺរលាកខួរក្បាលជប៉ុន៖

1. ចៀសវាងកុំឱ្យមូសខាំ



2. ចាក់ថ្នាំបង្ការដើម្បីទប់ស្កាត់វីរុស

អ្នកអាចការពារខ្លួនអ្នកប្រឆាំងនឹងវីរុស ដោយអនុវត្តដូចតទៅនេះ៖

- ចៀសវាងកុំទៅកន្លែងមានមូសច្រើនដែលនៅជិតវាលទំនាបជាំទឹក ជាកន្លែងដែលមានបក្សីទឹក និងសត្វជ្រូកព្រៃរស់នៅ
- ប្រើសម្លៀកបំពាក់ល្អ ពណ៌ស្រាលសម្រាប់ពាក់នៅក្រៅផ្ទះដើម្បីការពារខ្លួន ហើយត្រូវគ្របបិទបាំងជើង ប្រអប់ជើង និងដៃ ឱ្យបានជិត។
- ចៀសវាងកុំនៅក្រៅផ្ទះ នៅពេលដែលមូសចេញធ្វើសកម្មភាពនៅមុនពេលថ្ងៃលិចនៅក្នុងពេលរាត្រី និងព្រលឹមស្រាងៗ។
- ប្រើថ្នាំបណ្តេញសត្វមូសសម្រាប់មនុស្ស ដែលមានផ្ទុកសារធាតុ ដាយស៊ីអាតូលូអាមីន (diethyl toluamide [DEET]), ពីការីឌីន (picaridin) ឬ PMD (ដែលចម្រាញ់ចេញពីដើមប្រេងខ្យល់យូកាលីបមានក្លិនដូចក្រូចឆ្មារ) ដោយបាញ់ ឬលាបថ្នាំនេះ នៅលើស្បែកដែលគ្មានអ្វីបិទបាំង។
- ត្រូវមើលការពារទារកនិងកុមារឱ្យបានល្អដើម្បីកុំឱ្យមូសខាំ។
- ពេលនៅក្នុងកន្លែងឬដីរោងក្រៅផ្ទះដែលមានដំបូល ឬកន្លែងមិនសូវមានខ្យល់ ចូរប្រើដូបឬទាសបណ្តេញមូសដោយការប្រើកម្ដៅ ឬឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ដោយមានទ្រនាប់មានជាតិថ្នាំកម្ចាត់សត្វល្អិត ។
- ធ្វើឱ្យប្រាកដថាទ្វារសំណាញ់នៅក្នុងផ្ទះ ឬខាវ៉ាន (caravan) មានលក្ខណៈល្អ មិនរលែកឆ្លុះឆ្លាយ។
- ទទួលបានដំណេកនៅក្នុងគង់ការពារមិនឱ្យមូសចូលបាន ឬក៏នៅក្នុងមុងរបង្ការមិនឱ្យមូសចូលបាននៅពេលទៅបោះដំ
- ចាក់ចោលទឹកនៅក្នុងធុង ឬប៉ោក ដែលមូសអាចរស់នៅបង្កបង្កើនកូនចៅ។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម អំពីជំងឺរលាកខួរក្បាលជប៉ុនសូមមើល៖ <https://nt.gov.au/wellbeing/health-conditions-treatments/viral/japanese-encephalitis>

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម អំពីជំងឺរលាកខួរក្បាលជប៉ុននៅក្នុងពពួកសត្វផ្សេងៗ ដោយរួមទាំងសញ្ញានៃជំងឺនេះ សូមមើល៖ <https://nt.gov.au/japanese-encephalitis>