

ΕΜΒΟΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΟΚΟΚΚΟ Β

Το εμβόλιο για τον μηνιγγιτιδόκοκκο Β διατίθεται πλέον δωρεάν για βρέφη ηλικίας 6 εβδομάδων έως 2 ετών.

Προστατεύστε το μωρό σας από τον μηνιγγιτιδόκοκκο Β, μια σπάνια αλλά σοβαρή βακτηριακή ασθένεια.

Η Κυβέρνηση της Βόρειας Επικράτειας παρέχει ένα πρόγραμμα δωρεάν εμβολιασμού για τον μηνιγγιτιδόκοκκο Β, για την προστασία εκείνων που διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο.

Το εμβόλιο για τον μηνιγγιτιδόκοκκο Β διατίθεται δωρεάν για:

- Βρέφη ηλικίας 6 εβδομάδων έως 12 μηνών
- Μαθητές της 9ης τάξης (4ης Γυμνασίου)
- Παιδιά ηλικίας 12 μηνών έως 2 ετών και εφήβους ηλικίας 15-19 ετών (μέχρι το 2027 στο πλαίσιο προγράμματος αναπλήρωσης εμβολιασμών).

Τι είναι η μηνιγγιτιδοκοκκική νόσος;

Η μηνιγγιτιδοκοκκική νόσος είναι μια σπάνια αλλά σοβαρή λοίμωξη που εμφανίζεται όταν τα βακτήρια του μηνιγγιτιδόκοκκου εισβάλλουν στο σώμα μέσω της μύτης ή του λαιμού, μέσω στενής και παρατεταμένης επαφής. Η ασθένεια μπορεί να εξελιχθεί γρήγορα και είναι δύσκολο να διαγνωστεί νωρίς. Το άτομο που μεταφέρει τα βακτήρια είναι συνήθως τελείως καλά.

Οι περισσότεροι άνθρωποι που προσβάλλονται από τη μηνιγγιτιδοκοκκική νόσο αναρρώνουν πλήρως, αλλά ορισμένοι μπορεί να αναπτύξουν μακροχρόνιες επιπλοκές υγείας, όπως παραμορφώσεις στα άκρα, ουλές στο δέρμα, κώφωση και εγκεφαλικές βλάβες. Σε 5-10% των περιπτώσεων η νόσος είναι θανατηφόρα.

Υπάρχουν διάφοροι τύποι βακτηρίων του μηνιγγιτιδόκοκκου. Οι κύριοι τύποι που προκαλούν μηνιγγιτιδοκοκκική νόσο είναι οι Α, Β, C, W και Y

Δικαιούται το μωρό μου δωρεάν εμβόλιο μηνιγγιτιδόκοκκου Β;

Τα βρέφη και οι νέοι διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης διηθητικής μηνιγγιτιδοκοκκικής νόσου τύπου Β.

Τα βρέφη ηλικίας 6 εβδομάδων έως 12 μηνών θα λαμβάνουν πλέον το εμβόλιο μηνιγγιτιδόκοκκου Β, Bexsero®, επιπλέον με το εμβόλιο για τον μηνιγγιτιδόκοκκο ACWY, το οποίο παρέχεται στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμού.

Τα παιδιά ηλικίας άνω των 12 μηνών έως λιγότερο από 2 ετών είναι επίσης επιλέξιμα στο πλαίσιο προγράμματος αναπλήρωσης εμβολιασμών, έως το 2027.

Εάν το παιδί σας έχει ήδη ολοκληρώσει τον εμβολιασμό με το εμβόλιο Bexsero®, δεν χρειάζεται να επαναλάβετε τον εμβολιασμό.

Μπορεί το παιδί μου να κάνει το εμβόλιο μαζί με τα άλλα προγραμματισμένα εμβόλια;

Το εμβόλιο για τον μηνιγγιτιδόκοκκο B μπορεί να χορηγηθεί με ασφάλεια μαζί με τα άλλα προγραμματισμένα παιδικά εμβόλια, στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμού, από την ηλικία των 6 εβδομάδων. Τα παιδιά κάτω των 12 μηνών θα χρειαστούν τρεις δόσεις του εμβολίου ενώ τα παιδιά άνω των 12 μηνών θα χρειαστούν δύο δόσεις.

Υπάρχουν παρενέργειες μετά το εμβόλιο;

Συνηθισμένες παρενέργειες μετά τον εμβολιασμό για τον μηνιγγιτιδόκοκκο B συμπεριλαμβάνουν:

- Πυρετό
- Πόνο
- Ερυθρότητα, οίδημα ή σκληρό εξόγκωμα στο σημείο της ένεσης
- Ευερεθιστότητα
- Υπνηλία
- Ασυνήθιστο κλάμα και αλλαγή στην όρεξη
- Πονοκέφαλο και αίσθημα αδιαθεσίας (συνηθέστερο σε εφήβους και νεαρούς ενήλικες).

Γιατί συνιστάται η χορήγηση παρακεταμόλης (Paracetamol) σε παιδιά κάτω των 2 ετών μετά το εμβόλιο;

Για να μειωθεί ο κίνδυνος εμφάνισης πυρετού μετά το εμβόλιο, συνιστάται η χορήγηση παρακεταμόλης εντός 30 λεπτών πριν, ή το συντομότερο δυνατόν μετά, τον εμβολιασμό. Αυτό ισχύει ανεξάρτητα από το αν το παιδί έχει πυρετό ή όχι.

Δόση 1 - 30 λεπτά πριν από τον εμβολιασμό ή το συντομότερο δυνατόν μετά

Δόση 2 - 6 ώρες μετά την πρώτη δόση παρακεταμόλης, ακόμα και αν δεν υπάρχει πυρετός

Δόση 3 - 6 ώρες μετά τη δεύτερη δόση παρακεταμόλης, ακόμα και αν δεν υπάρχει πυρετός

Εάν το παιδί τις εμφανίσει πυρετό που δεν ελέγχεται επαρκώς σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες, ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Πού μπορώ να εμβολιάσω το μωρό μου;

Ο εμβολιασμός για τον μηνιγγιτιδόκοκκο B είναι διαθέσιμος από ιατρούς (GPs), φαρμακεία, κέντρα κοινοτικής φροντίδας, υπηρεσίες υγείας σε απομακρυσμένες περιοχές.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον ιστότοπο της NT Health.

Σαρώστε τον κωδικό για περισσότερες πληροφορίες.

