

## VAKSIN MENINGOKOKUS B

### Vaksin meningokokus B gratis untuk bayi berumur 6 minggu sampai 2 tahun

#### Melindungi bayi Anda terhadap meningokokus B, penyakit langka namun serius yang disebabkan oleh bakteri

Pemerintah Northern Territory menyediakan program vaksinasi meningokokus B gratis, untuk melindungi mereka yang memiliki risiko tinggi.

Vaksinasi meningokokus B disediakan gratis untuk:

- Para bayi berumur antara 6 minggu sampai 12 bulan
- Para siswa kelas 9
- Anak-anak berumur antara 12 bulan sampai 2 tahun dan kaum remaja berumur antara 15-19 tahun (sampai tahun 2027 sebagai bagian dari program untuk mengejar ketinggalan)

#### Apa itu penyakit meningokokus?

Penyakit meningokokus merupakan infeksi parah yang langka yang terjadi saat bakteri meningokokus menyerang tubuh dari hidung atau tenggorokan melalui kontak dekat yang berlangsung lama. Penyakit ini dapat berkembang dengan cepat dan mungkin sulit untuk mendiagnosisnya secara dini. Orang yang membawa bakteri ini biasanya nampak sehat.

Sebagian besar orang yang menderita infeksi meningokokus sembuh total, namun beberapa orang dapat mengalami komplikasi kesehatan jangka panjang termasuk kerusakan bentuk tungkai, parut luka di kulit, ketulian dan kerusakan otak. Penyakit ini dapat menyebabkan kematian dalam 5-10% dari semua kasus.

Terdapat beberapa jenis sub tipe bakteri meningokokus yang berbeda. Sub tipe utama yang menyebabkan penyakit meningokokus adalah A, B, C, W dan Y.

#### Apakah bayi saya berhak mendapatkan vaksin meningokokus B gratis?

Bayi-bayi dan anak-anak muda memiliki risiko yang lebih besar terhadap penyakit meningokokus invasif.

Bayi berumur 6 minggu sampai 12 bulan akan mendapatkan vaksin meningokokus B, Bexsero®, selain vaksin meningokokus ACWY yang disediakan sebagai bagian dari Program Imunisasi Nasional.

Anak-anak yang berumur di atas 12 bulan sampai sebelum 2 tahun juga berhak mendapatkan vaksin ini sebagai bagian dari program mengejar ketinggalan, sampai tahun 2027.

Apabila anak Anda sudah mendapatkan vaksinasi yang lengkap dengan vaksin Bexsero®, maka tidak perlu mengulangi vaksinasi itu.

## Apakah anak saya bisa mendapatkan vaksin dengan jadwal imunisasi lainnya?

Vaksin meningokokus B dapat diberikan secara aman dengan vaksin anak-anak lainnya yang dijadwalkan sebagai bagian dari Program Imunisasi Nasional standar, dari umur 6 minggu. Anak-anak yang berumur di bawah 12 bulan perlu mendapatkan tiga dosis vaksin, sedangkan anak-anak yang berumur di atas 12 bulan perlu mendapatkan dua dosis.

## Apakah ada efek sampingan setelah vaksinasi ini?

Efek sampingan yang umum terjadi setelah imunisasi meningokokus B termasuk:

- Demam
- Rasa sakit
- Kemerahan, pembengkakan atau bintil (benjolan kecil keras) pada lokasi suntikan
- Cerewet
- Rasa mengantuk
- Menangis yang tidak biasa dan perubahan nafsu makan
- Sakit kepala dan merasa tidak sehat (lebih sering dilaporkan oleh para remaja dan orang dewasa muda).

## Mengapa parasetamol direkomendasikan untuk anak-anak yang berumur di bawah 2 tahun saat mendapatkan vaksin?

Untuk mengurangi risiko demam setelah vaksinasi, parasetamol direkomendasikan dalam waktu 30 menit sebelum, atau segera sesudah mendapatkan vaksin. Tanpa menghiraukan apakah anak mengalami demam atau tidak.

- Dosis 1 – 30 menit sebelum vaksinasi atau sesegera mungkin sesudahnya
- Dosis 2 – 6 jam sesudah dosis parasetamol pertama, meskipun tidak ada demam
- Dosis 3 – 6 jam sesudah dosis parasetamol kedua, meskipun tidak ada demam

Jika anak Anda mengalami demam yang tidak terkontrol dengan baik setelah mengikuti rekomendasi ini, mintalah nasihat medis.

## Di mana saya bisa mendapatkan imunisasi untuk bayi saya?

Imunisasi meningokokus B bisa didapatkan di dokter umum, apotek, pusat perawatan masyarakat dan layanan kesehatan terpencil.

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi situs web NT Health.

**Pindai untuk  
informasi lebih lanjut**

