

## B 型脑膜炎 (MENINGOCOCCAL B) 疫苗

**B 型脑膜炎疫苗现在向婴儿免费提供，年龄六周至两岁之间。**

**B型脑膜炎是一种少见但严重的细菌疾病，保护您的宝宝避免感染B型脑膜炎。**

北领地政府提供免费的B型脑膜炎疫苗接种服务，旨在保护最容易感染的人群。

B型脑膜炎疫苗对如下群体免费：

- 婴儿，六周至十二个月之间
- 九年级学生
- 幼儿，十二个月至两岁之间；青少年，十五至十九岁之间（作为补接种疫苗项目的一部分，2027年截止）

### 什么是脑膜炎？

脑膜炎是一种少见但严重的感染，脑膜炎细菌通过长期的近距离接触由鼻腔或喉咙侵入人体。脑膜炎发病迅速，而且很可能很难早期做出诊断，通常携带脑膜炎细菌的人看起来完全健康。

大部分感染脑膜炎的人会完全康复，但是一些患者可能造成长期的健康问题，包括：肢体畸形、皮肤疤痕、失聪及脑损伤。其中百分之五至百分之十的脑膜炎病例致命。

脑膜炎细菌有几种不同的菌株，常见的为A型、B型、C型、W型和Y型。

### 我的宝宝可以免费接种B型脑膜炎疫苗吗？

婴儿及青少年感染侵入型B型脑膜炎的风险正在不在增加。

目前，年龄在六周至十二个月之间的婴儿在全国疫苗接种项目（National Immunisation Program）提供的 ACWY 脑膜炎疫苗的基础之上，将另外接种 B 型脑膜炎疫苗 Bexsero®。

作为补接种疫苗项目的一部分，截至2027年，年龄在十二个月以上两岁以下的幼儿同样有资格接种 B 型脑膜炎疫苗。

如果您的孩子已经完成接种全部 Bexsero® 脑膜炎疫苗，则其无需再次接种该疫苗。

## 我的孩子可以在接种其它适龄疫苗的同时接种B型脑膜炎疫苗吗？

婴儿满六周以后，B型脑膜炎疫苗可以与标准的全国疫苗接种项目同时进行，可安全接种。十二个月以下的婴儿需要接种共计三剂疫苗，十二个月以上的婴幼儿只需接种两剂疫苗。

## 接种疫苗后会有副作用吗？

B型脑膜炎疫苗常见的副作用包括：

- 发热
- 疼痛
- 红、肿或结节(针头处小且硬的肿块)
- 烦躁
- 嗜睡
- 非正常的哭泣或胃口变化
- 头疼、身体不适(更常见于青少年群体)

## 年龄在两岁以下的婴幼儿接种B型脑膜炎疫苗之后建议服用扑热息痛，为什么？

为降低接种疫苗之后发热，我们建议在接种疫苗前三十分钟或接种疫苗之后尽快给孩子服用扑热息痛，不管孩子是否发热：

- 第一剂 - 接种疫苗前三十分钟或接种疫苗之后
- 第二剂 - 尽管孩子没有发热，仍在第一次服用扑热息痛六小时之后再次服用
- 第三剂 - 尽管孩子没有发热，仍在第二次服用扑热息痛六小时之后再次服用

如果您按照上述建议服用扑热息痛，但是您的孩子接种之后出现不可控的发热症状，请及时就医。

## 到哪里可以为我的宝宝接种B型脑膜炎疫苗？

您可以在全科医生、药房、社区卫生中心及偏远地区卫生服务站接种B型脑膜炎疫苗。

获取更多相关信息，请访问北领地卫生部官网。

扫描二维码获取更多信息。

