

โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร

โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African swine fever, ASF) เป็นโรคจากเชื้อไวรัสที่ติดต่อได้ง่ายมากของสุกร ซึ่งกำลังแพร่กระจายอย่างรวดเร็วในยุโรปตะวันออก ประเทศจีน และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

การระบาดของ ASF ในออสเตรเลียจะมีผลกระทบอย่างมากต่อสุขภาพของสุกร การผลิตเนื้อสุกร และจะทำลายอุตสาหกรรมสุกรของออสเตรเลีย หากโรคนี้อเข้ามาในประเทศ

โรคนี้อแพร่กระจายได้ด้วยการสัมผัสโดยตรงกับสุกรที่ติดเชื้อ ยานพาหนะ อุปกรณ์ หรือเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนมีเชื้ออยู่ และยังแพร่กระจายได้ด้วยการให้สุกรกินเศษอาหาร (Swill) หรือ เศษชิ้นเนื้อที่ติดเชื้อมากด้วย

ขณะนี้ ยังไม่มีวัคซีนหรือการรักษาใด ๆ ต่อโรคนี้อ ถือเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องป้องกันไม่ให้ ASF เข้ามาในออสเตรเลีย และต้องการความช่วยเหลือจากคุณ

การปฏิบัติด้วยสุขอนามัยและความปลอดภัยทางชีวภาพที่แข็งแกร่งเป็นสิ่งสำคัญ

- ASF สามารถแพร่เชื้อโดยคนได้ทางผิวหนัง เสื้อผ้า รองเท้า และเส้นผม เมื่อคุณและคนงานของคุณเข้าสู่ฟาร์มหรือพื้นที่การผลิตแต่ละแห่ง ให้แน่ใจว่า คุณใช้:
 - เครื่องมือ รองเท้าบูท และอุปกรณ์จากฟาร์มนั้น ๆ หากมีการจัดให้
 - ที่ล้างเท้าเพื่อสวมรองเท้าในฟาร์ม
 - น้ำยาฆ่าเชื้อที่เหมาะสม เช่น Virkon S หรือคลอรีน เพื่อฆ่าเชื้ออุปกรณ์
- เมื่อคุณและคนงานของคุณออกจากฟาร์มหรือพื้นที่การผลิตแต่ละแห่ง ให้ฆ่าเชื้อรองเท้าบูท เสื้อผ้า ยานพาหนะ และอุปกรณ์ทุกชิ้นขณะออกจากพื้นที่ทุกครั้ง
- ล้างมือของคุณด้วยสบู่และน้ำทุกครั้ง ก่อนและหลังจับต้องตัวสัตว์

การเฝ้าระวังคนงานจากต่างประเทศ

- ผู้ที่สัมผัสกับสุกรที่บ้านในต่างประเทศของตน ควรรอเป็นเวลาเจ็ดวันก่อนมาสัมผัสกับสุกรในออสเตรเลีย หรือ หลีกเลี่ยงการสัมผัสใด ๆ เลย
- คนงานทุกคน ไม่ควรนำเสื้อผ้าหรืออุปกรณ์ที่ใช้กับสุกรในประเทศบ้านเกิดมาสู่ออสเตรเลีย

สัญญาณบอกเหตุ

การตรวจพบแต่เนิ่น ๆ เป็นกุญแจสำคัญในการกำจัดโรค
อาการของ ASF ประกอบด้วย:

- ตายอย่างกะทันหันหรือตายภายในหนึ่งถึงสองวัน
- ผิวหนังแดงมีจุดเลือดออก โดยเฉพาะที่หู
- มีอาการไม่ยอมกินอาหาร
- นอนสมตัวหรือซ่อนตัวอยู่ในมุม
- มีอาการท้องเสีย ซึ่งอาจมีเลือดปน

ปกป้องทรัพย์สินของคุณ

ค้นหาแหล่งข้อมูลเพื่อช่วยให้ฟาร์มของคุณสะอาดอยู่เสมอได้จากเว็บไซต์ความปลอดภัยทางชีวภาพของฟาร์มที่ farmbiosecurity.com.au

หากดูแลแล้วน่าสงสัย โทรหาเราที่ 1800 675 888.